

Panacur® PetPaste

187,5 mg/g στοματική πάστα για σκύλο και γάτα

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΙΤΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙΚάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Ολλανδία

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

FR - 27460 Igoville

Γαλλία

Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

Intervet Hellas AE, Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Ελλάδα

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Panacur PetPaste 187,5 mg/g στοματική πάστα για σκύλο και γάτα

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1 g στοματικής πάστας περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Fenbendazole 187,5 mg

Έκδοχα:

Methyl-4-hydroxybenzoate (E 218) 1,7 mg

Propyl-4-hydroxybenzoate (E 216) 0,16 mg

Λευκή έως ανοιχτή γκριζωπή, μαλακή, αλειφόμενη, ομοιογενής πάστα.

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)Για τη θεραπεία των λοιμώξεων με γαστρεντερικούς νηματώδεις σκύλους σε νεαρές και ενήλικες γάτες καθώς και σε νεαρούς και ενήλικες σκύλους. Επιπρόσθετα σε σκύλους επικουρικά για τον έλεγχο του πρωτόζωου *Giardia*.Νεαρές και ενήλικες γάτες:

Λοιμώξεις με τους ακόλουθους γαστρεντερικούς νηματώδεις σκύλους:

Toxocara cati (ενήλικα στάδια)*Ancylostoma tubaeforme* (προνυμφικές μορφές και ενήλικα στάδια)Νεαροί και ενήλικοι σκύλοι:

Λοιμώξεις με τα ακόλουθα γαστρεντερικά παράσιτα:

Toxocara canis (ενήλικα στάδια)*Ancylostoma caninum* (ενήλικα στάδια)*Uncinaria stenocephala* (προνυμφικές μορφές και ενήλικα στάδια) και *Giardia* spp.**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυους σκύλους μέχρι την 39^η ημέρα της κύησης.

Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυες γάτες.

Βλέπε επίσης Παράγραφο 12. "Ειδικές προειδοποιήσεις".

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα ζώα στα οποία έχει χορηγηθεί το προϊόν μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν έμετο ή ελαφρά διάρροια που συνδυάζεται με την αποπαρασίτωση.

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εγχειρίδιο Φύλλο Οδηγίων Χρήσης ή συμβιβάζεται για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος και γάτα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Κάθε σύριγγα περιέχει 4,8 g πάστας, ισοδύναμη με 900 mg φαινβενδαζόλης. Το έμβολο φέρει 18 χαραγές διαβάθμισης και η κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 50 mg φαινβενδαζόλης. Ο επιθυμητός αριθμός μονάδων επιλέγεται στρέφοντας το δακτυλίδι στο έμβολο.

Μία σύριγγα Panacur PetPaste είναι κατάλληλη για χρήση σε ζώα συντροφιάς με σωματικό βάρος έως 6 kg. Εάν το σωματικό βάρος του ζώου υπερβαίνει τα 6 kg, είναι απαραίτητη η χρήση περισσότερων της μιας σύριγγων.

Ενήλικες γάτες

Η δοσολογία είναι 75 mg φαινβενδαζόλης/kg σωματικού βάρους (σ.β.) την ημέρα για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Η ημερήσια δόση για 2 kg σωματικού βάρους αντιστοιχεί σε 3 χαραγές διαβάθμισης στο έμβολο. Το δοσολογικό σχήμα που προκύπτει είναι το ακόλουθο:

έως 2 kg σ.β.	3 χαραγές διαβάθμισης στη σύριγγα την ημέρα για 2 ημέρες
2,1 έως 4 kg σ.β.	6 χαραγές διαβάθμισης στη σύριγγα την ημέρα για 2 ημέρες
4,1 έως 6 kg σ.β.	9 χαραγές διαβάθμισης στη σύριγγα την ημέρα για 2 ημέρες

κ.λπ.

Το σωματικό βάρος του ζώου στο οποίο θα χορηγηθεί αγωγή πρέπει να προσδιορίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια για τον υπολογισμό της απαιτούμενης δοσολογίας.

Νεαρές γάτες, νεαροί και ενήλικοι σκύλοι

Η δοσολογία είναι 50 mg φαινβενδαζόλης/kg σ.β. την ημέρα για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Το δοσολογικό σχήμα είναι το ακόλουθο:

1,0 έως 2 kg σ.β.	2 χαραγές διαβάθμισης στη σύριγγα την ημέρα για 3 ημέρες
2,1 έως 3 kg σ.β.	3 χαραγές διαβάθμισης στη σύριγγα την ημέρα για 3 ημέρες

3,1 έως 4 kg σ.β.

4,1 έως 5 kg σ.β.

5,1 έως 6 kg σ.β.

κ.λπ.

Ειδικά σε συνθήκες έντονου παρασιτισμού, η καταπολέμηση του *Ancylostoma tubaeforme* στις ενήλικες γάτες, της *Giardia* spp. στους σκύλους και των σκασκιδίων κυρίως στους νεαρούς σκύλους και στις νεαρές γάτες είναι δυνατό να είναι ελλιπής σε μεμονωμένα ζώα, έτσι ώστε να παραμένει ο κίνδυνος μόλυνσης για τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνεται κοπρολογική εξέταση και βάσει των αποτελεσμάτων να επαναλαμβάνεται η αγωγή εάν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την κρίση του κτηνιάτρου.**9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Για να προετοιμάσετε τη σύριγγα Panacur PetPaste για την πρώτη χρήση, αφαιρέστε το πώμα της σύριγγας και γυρίστε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο έως την άκρη του δακτυλίου που βρίσκεται πιο κοντά στη διαγράμμιση με μηδέν (0) στο σωληνάριο. Πιέστε το έμβολο και απορρίψτε την πάστα που εξέρχεται. Η σύριγγα είναι έτοιμη για χρήση. Το έμβολο φέρει 18 χαραγές διαβάθμισης και η κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 50 mg φαινβενδαζόλης. Υπολογίστε τον αριθμό των διαβαθμίσεων που απαιτούνται με βάση το σωματικό βάρος του ζώου. Γυρίστε τον δακτύλιο στο έμβολο έως την αντίστοιχη χαραγή διαβάθμισης.

Το Panacur PetPaste πρέπει να χορηγείται απευθείας στο στόμα του ζώου μετά από το γεύμα, πιέζοντας την πάστα από τη σύριγγα στη βάση της γλώσσας.

Εναλλακτικά, η πάστα μπορεί να αναμιχθεί με την τροφή.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά από το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:

Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα των παρασίτων σε οποιαδήποτε ομάδα ανθελμινθικών, μετά από συχνή, επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ομάδας αυτής.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

Καθώς η ακρίβεια του υπολογισμού της δόσης είναι περιορισμένη, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεαρές γάτες και νεαρούς σκύλους που ζυγίζουν λιγότερο από 1 kg.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Αποφύγετε την άμεση επαφή του προϊόντος με το δέρμα.

Πλύνετε τα χέρια μετά από τη χρήση.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε οποιοδήποτε έκδοχο πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Εγκυμοσύνη και γαλουχία:Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυους σκύλους μέχρι την 39^η ημέρα της κύησης.

Το Panacur PetPaste μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία έγκυων σκύλων κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίτου της εγκυμοσύνης. Εν τούτοις, επειδή δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν τελείως συμπτώματα τερατογένεσης που προκαλούνται σε σπάνιες περιπτώσεις από το μεταβολίτη της φαινβενδαζόλης οξφενδαζόλη, η χορήγηση πρέπει να γίνεται μετά από την εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυες γάτες.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκύλους και γάτες κατά την περίοδο της γαλουχίας.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Σε σκύλους, μετά από τη χορήγηση τριπλάσιας ποσότητας της συνιστώμενης δόσης ή τριπλάσιας διάρκειας της προτεινόμενης διάρκειας χρήσης, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική πρόκληση λεμφοειδούς υπερπλασίας του γαστρικού βλεννογόνου. Τα ευρήματα αυτά δεν συνοδεύονται από κλινικά συμπτώματα.

Στις γάτες, μετά από υπερδοσολογία με το ίδιο δοσολογικό σχήμα, δεν παρατηρήθηκαν σχετικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σεπτέμβριος 2020

15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Το προϊόν διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.