

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SEBACIL®

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Germany

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SEBACIL®

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα 100 ml διαλύματος περιέχουν:

Δραστικό συστατικό: 50 g Phoxim

Έκδοχα: N-Butanol, Methylisobutylketone, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol (27)-ether, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol (17)-ether, Calcium salt of n-Dodecylbenzolsulfonic acid, Xylol

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την καταπολέμηση της σαρκοπτικής ψώρας, των φθειρών, των μυγών, των κροτώνων και των άλλων εξωπαρασίτων των προβάτων και των σκύλων. Μερικά από τα κυριότερα ακάρεα, κρότωνες και δίπτερα που είναι ευαίσθητα στο SEBACIL® δερματικό διάλυμα είναι τα εξής: *Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*, *Psorergates ovis*, *Melophagus ovinus*, *Damalinia ovis*, *Lucilla cuprina*, *Rhipicephalus evertsi*, *Hyaloma* spp., *Amblyoma*, *Boophilus* spp., *Stomomys calcitrans* και *Musca autumnalis*.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η χρήση του μαζί με ζωοτροφές ή το πόσιμο νερό (τότε είναι δηλητήριο).

Να μη χορηγείται σε ασθενή, πολύ καταπονημένα ή σε υπό ανάρρωση ζώα. Προσοχή στη χορήγηση του προϊόντος σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, βρογχοσπασμό, επιληπτικές κρίσεις και παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών. Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά ζώα, τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα, Σκύλος

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το SEBACIL® δερματικό διάλυμα χρησιμοποιείται είτε υπό μορφή λουτρών ή υπό μορφή ψεκασμών. Προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Τότε είναι ακίνδυνο και γίνεται καλά ανεκτό από τα ζώα. Αφού ανοίχτει προσεκτικά το φιαλίδιο, αραιώνεται με νερό σε αναλογία:

Ψεκασμός: 1 ml SEBACIL® δερματικό διάλυμα σε 1 λίτρο νερού

Αντιπαρασιτικά λουτρά: 1 ml SEBACIL® δερματικό διάλυμα σε 2 λίτρα νερού

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Αποφύγετε την άμεση επαφή του προϊόντος και του διαλύματος, που έχει προετοιμαστεί, με το δέρμα και τα μάτια.

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα πλύνετε με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό.
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια (γάντια ασφαλείας μιας χρήσεως από νιτρίλιο), προστατευτικά ρούχα (μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, μπότες και αδιάβροχη ποδιά) και γυαλιά ασφαλείας, κατά τη χρήση του προϊόντος.
Ρούχα που μολύνθηκαν κατά λάθος πρέπει να αφαιρούνται αμέσως.
Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού.
Μην ψεκάζετε αντίθετα με τη φορά του ανέμου.
Όταν ο ψεκασμός γίνεται σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποιήστε μια μάσκα σωματιδίων μισού προσώπου FFP3 (προστασία από λεπτή σκόνη και υδρατμούς).
Μην ψεκάζετε παρουσία μη προστατευμένων προσώπων.
Όπως και με όλα τα οργανοφωσφορικά, σε περίπτωση τοξικών συμπτωμάτων αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και επιδείξτε την ετικέτα του προϊόντος.

Υπερδοσολογία

Όπως με όλα τα οργανοφωσφορικά, η υπερδοσία ενδέχεται να οδηγήσει σε τοξίκωση με συμπτώματα, όπως σιελόρροια, νυσταγμός, διάρροια, αταξία, μυϊκούς σπασμούς, αναπνευστική δυσχέρεια και απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω στο ζώο ή στο άτομο που χορηγεί το προϊόν, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου ή ιατρού.
Οι περιπτώσεις δηλητηριάσεων (λήψη με την τροφή από απροσεξία ή αμέλεια κλπ.) αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση θεικής ατροπίνης 1% ως εξής:
Πρόβατα-Σκύλος: 2-5 ml
Σε σοβαρές περιπτώσεις επαναλάβετε την ένεση έπειτα από 30 λεπτά.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: Πρόβατα: 30 ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε γαλακτοπαραγωγά ζώα, το γάλα των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 6 μήνες
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση (αραιωμένο προϊόν): 24 ώρες (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.
Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε κατά τη χρήση του προϊόντος.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή επαφή με τους οφθαλμούς, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Απορρίψτε τις κενές φιάλες ή τα υλικά συσκευασίας με πλήρη ασφάλεια σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. Προσοχή επιβλαβές, εύφλεκτο.
Μη μολύνετε τα ποτάμια, τους ταμιευτήρες νερού, τις υδάτινες οδούς, τα φράγματα και άλλες πηγές νερού.
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πουλιά και τις μέλισσες. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλες των 30 ml, 100 ml, 250 ml, 1 L και 5 L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 5592/31-01-2011/K-0025301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777**