



# Vitamin E-Selen

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

## 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**VITAMIN E-SELEN** Ενέσιμο διάλυμα . Alpha tocopheryl acetate (βιταμίνη Ε), Sodium selenite x 5H<sub>2</sub>O ( 150mg/ml +1,67mg/ml) για Ιπποειδή, Βοοειδή, Πρόβιατα, Αίγες, Χοίρους

## 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)

Δραστικά συστατικά

- Alpha tocopheryl acetate (βιταμίνη Ε)	150,0 mg/ml
- Sodium selenite x 5H <sub>2</sub> O	1,67 mg/ml
ισοδύναμα με	0,500 mg/ml σεληνίου

Εκδόχα

- Cremophor EL (polyoxyl 35 castor oil)	160,0 mg/ml
- Benzyl alcohol	10,0 mg/ml
- Phenol	5,00 mg/ml
- Ενέσιμο ύδωρ	QSP 1 ml

## 3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 15123

Παραγωγός - Υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτιδών  
aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 SENDEN-BÖSENSELL, GERMANY

## 4. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Βοοειδή, Χοίροι, Πρόβιατα, Αίγες, Ιπποειδή.

## 5. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία και πρόληψη ασθενειών του μυϊκού συστήματος (νόσος του λευκού μυός), και άλλων ασθενειών που προκαλούνται από ανεπάρκεια βιταμίνης Ε και/ή σεληνίου (mulberry heart disease). Πρόληψη ανεπάρκειας βιταμίνης Ε και/ή σεληνίου σε καταστάσεις στρες.

## 6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Χοιρίδια	1-2 ml
Χοίροι, χοιρομήτρες	5-10 ml
Αμνοί	2-3 ml
Πρόβιατα, αίγες, μόσχοι	5 ml
Βοοειδή, ίπποι	10 ml

## 7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη ενδομυϊκή ή υποδόρια ένεση.

## 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

## 9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Νεογνότητα ζώα : Η χορήγηση του **VITAMIN E-SELEN** αντενδείκνυται σε νεογνότητα ζώα, λόγω της περιεκτικότητας του προϊόντος σε βενζυλαλκοόλη (benzyl alcohol).

## 10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις : λόγω της περιεκτικότητας σε polyoxyl 35 castor oil, είναι πιθανό να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, ειδικά σε ζώα που προηγούμενα είχαν δεχτεί ενέσεις με διαλύματα που περιέχουν το έλαιο αυτό. Η έκταση των αντιδράσεων αυτών ποικίλλει από τοπικές αντιδράσεις στο σημείο ένεσης έως σοβαρές γενικευμένες αντιδράσεις, και αυτό εξαρτάται από την ευαισθησία των ζώων στους αλλεργιογόνους παράγοντες.

<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνίατρό σας.>

## 11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βρώσιμοι ιστοί : Ήπαρ και σημείο ένεσης	7 ημέρες
Άλλοι ιστοί	0 ημέρες
Γάλα	0 ημέρες

## 12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C, μακριά από φως. Διάρκεια ζωής : 2 χρόνια μετά την ημερομηνία παρασκευής του. Μετά το πρώτο άνοιγμα, παραμένει σταθερό για 4 εβδομάδες.

## 13. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
Να καταστρέφονται σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες Εθνικές διατάξεις

## 15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

19-1-2006

## 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γυάλινα φιαλίδια καφέ χρώματος, των 100 ml και 50 ml  
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 30144/2-8-2000

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.77.93.777

2909/0214

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ