

# GENTIPRAMOX®

## Ενέσιμο εναιώρημα

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ:

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ΙΣΠΑΝΙΑ

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α):**

Κάθε ml του GENTIPRAMOX περιέχει:

Amoxycillin trihydrate 150 mg

Gentamicin (sulphate) 40 mg

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**

**Βοοειδή:** Βακτηριακές πνευμονίες, κολιβακίλλωση και σαλμονέλλωση των μύσων.

**Χοίροι:** Βακτηριακές πνευμονίες, κολιβακίλλική γαστρεντερίτιδα χοιριδίων, κολιβακίλλική μαστίτιδα σιών, σύνδρομο M.M.A. σιών.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Καμία.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:**

Μακρόχρονη θεραπευτική αγωγή με υψηλότερες δόσεις από εκείνες που προτείνονται είναι δυνατό να προκαλέσουν νεφρική δυσλειτουργία.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγίων χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

**ΕΙΔΗ ΣΩΩΝ:**

Βοοειδή και χοίροι.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:**

Βαθεία ενδομυϊκή ένεση.

Γενικά, η ημερήσια δόση ανέρχεται σε 1 ml/10 Kg Σ.Β. και διάρκεια 2-3 ημέρες.

**Βοοειδή:** Ενήλικα 30-40 ml/24 h, Μόσχοι 10-15 ml/24 h.

**Χοίροι:** Ενήλικα 5-10 ml/24 h, νεαρά ζώα 1-5 ml/24 h.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:**

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Όταν το προϊόν παραμένει για αρκετό χρόνο είναι δυνατό να διαχωριστεί σε δύο στοιβάδες. Το εναιώρημα αποκαθίσταται εύκολα όταν ανακινήθει.

Όταν η ποσότητα της δόσης του φαρμάκου είναι μεγάλη (π.χ. Βοοειδή), συνιστάται να μοιράζεται και να ενίεται σε δύο διαφορετικά σημεία του σώματος.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:**

**Βοοειδή-χοίροι:** (Κρέας και εδωδιμοί ιστοί): 30 ημέρες.

Γάλα (αγελάδες): 2 ημέρες (4 αμέλξεις).

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

**ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ):**

Καμία.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:**

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:**

20-9-12.

**ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Κουτί με 1 φιάλη των 20 και 100 ml.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο:

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:**

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ψυχάρη 3 / 184 53 Νίκαια - ΕΛΛΑΣ

Τηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661

e-mail: greece@hipra.com



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com