

# SULFAMYCINE®

Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα

Για την αντιμετώπιση διαφόρων εντερικών διαταραχών που εμφανίζουν διάρροια και απώλεια ηλεκτρολυτών

## ΣΥΝΘΕΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

-Neomycin.....33 mg  
-Phthalylsulfathiazole.....150 mg  
-Έκδοχα.....έως.....1 g

Η νεομυκίνη, αντιβιοτικό με ευρύ φάσμα δράσης, λόγω της ιδιότητάς της να μην απορροφάται από το έντερο, δρα ως ισχυρός αντισηπτικός παράγοντας εναντίον θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροβίων που προσβάλλουν τον εντερικό σωλήνα.

Από τα έκδοχα: α) η καολίνη δρα κυρίως ως αδρανής ουσία που προστατεύει το βλεννογόνο που φλεγμαίνει και απορροφά μικροοργανισμούς, τοξίνες και αέρια. β) η πηκτίνη, υδατάνθρακας που λαμβάνεται από φρούτα, δρα αντιδιαρροϊκά. Η διάσπασή της στο κόλον διαμορφώνει δυσμενές περιβάλλον για την ανάπτυξη της μη φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας που προκαλεί τη διάρροια. γ) τα άλατα βοηθούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών που διαταράσσεται με τη διάρροια και επομένως στην αποκατάσταση της αφυδάτωσης.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εντερίτιδες, γαστρεντερίτιδες βοοειδών, χοίρων, ιπποειδών, μικρών μηρυκαστικών και ζώων συντροφιάς.

Δυσεντερίες χοίρων.

Πεπτικές διαταραχές θηλαζόντων ζώων.

Ανωμαλίες της εντερικής ζύμωσης.

## ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορήγηση από το στόμα μέσα σε μικρή ποσότητα νερού, γάλατος ή τροφής.

Σκύλοι, γάτες, αμνοερίφια, κουνέλια: 5 g / 6ωρο.

Μόσχοι, χοίροι, πώλοι, αιγοπρόβατα: 10 g / 8ωρο.

Βοοειδή, ιπποειδή: 10 g / 4ωρο.

## ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: 6 ημέρες.