



MICOSPECTONE®

INJ. SOL.

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:
FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) Italy

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MICOSPECTONE INJ. SOL.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1 ml του προϊόντος περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

lincomycin hydrochloride (ισοδύναμη προς lincomycin 50,0 mg) 56,70 mg - spectinomycin hydrochloride (ισοδύναμη προς spectinomycin 100,0 mg) 150,00 mg

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
ΧΟΙΡΟΙ:

Το MICOSPECTONE INJ. SOL. ενδείκνυται για τη θεραπεία της βακτηριακής και της μυκοπλασματικής πνευμονίας, της δυσεντερίας των χοίρων (T. hyodysenteriae), της βακτηριακής εντερίτιδας και της λοιμώδους αρθρίτιδας.

ΝΕΑΡΟΙ ΜΟΣΧΟΙ:

Το MICOSPECTONE INJ. SOL. ενδείκνυται για τη θεραπεία των μικροβιακών επιπλοκών της ιογενούς πνευμονοεντερίτιδας των μόσχων.

ΣΚΥΛΟΣ-ΓΑΤΑ:

Το MICOSPECTONE INJ. SOL. ενδείκνυται για τη θεραπεία της πνευμονίας, της βρογχίτιδας, της ρινοτραχειίτιδας, της φαρυγγίτιδας, της αμυγδαλίτιδας, του πυοδέρματος, των αποστημάτων, των επιμολυσμένων τραυμάτων, της κυστίτιδας, της μητρίτιδας και της γαστρεντερίτιδας.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ιστορικό ευαισθησίας σε ένα από τα δύο αντιβιοτικά ή στο συνδυασμό.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, γαστρεντερικές διαταραχές (έμετος, διάρροια), πόνος στην περιοχή της ένεσης.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι, νεαροί μόσχοι, σκύλος, γάτα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται με βαθιά ενδομυϊκή ένεση σε πλέον του ενός σημεία.

Χοίροι: 1 ml/10 kg σ.β. ανά 24 ώρες επί 3-7 ημέρες.

Νεαροί μόσχοι: 1 ml/10 kg σ.β. ανά 12-24 ώρες επί 2 - 4 ημέρες.

Σκύλος-γάτα: 1 ml/5 kg σωματικού βάρους ανά 24ωρο ή 12ωρο. Η αγωγή διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες και μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση του κτηνιάτρου έως και 21 ημέρες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Χορηγείται με βαθιά ενδομυϊκή ένεση σε πλέον του ενός σημεία.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: (Χοίροι, νεαροί μόσχοι): 14 ημέρες.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, προστατευμένο από το φως.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

- Να μη χορηγείται το προϊόν ταυτόχρονα με μυοχαλαρωτικά.

- Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η λινκομυκίνη είναι ασύμβατη με την αμπικιλίνη, τη βενζυλική πενικιλίνη, την κολιστίνη, την καναμυκίνη και την ερυθρομυκίνη.

- Η σπεκτινομυκίνη μπορεί να αντιδράσει με το λίθιο.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 24.11.2004

15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το MICOSPECTONE είναι συνδυασμός λινκομυκίνης (αντιβιοτικό της ομάδας λινκοσαμίδης) και σπεκτινομυκίνης (μία αμινοκυκλιτόλη).

Και οι δύο δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση, η λινκομυκίνη μέσω του δεσμού με την ριβοσωμιακή υπομονάδα 50S και η σπεκτινομυκίνη με την ριβοσωμιακή υπομονάδα 30S.

Για ότι αφορά την φαρμακολογική δράση, το φάσμα δράσης της λινκομυκίνης περιλαμβάνει κυρίως θετικούς κατά Gram μικροοργανισμούς και Μυκοπλάσματα.

Το φάσμα της σπεκτινομυκίνης είναι ευρύτερο από εκείνο της λινκομυκίνης και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των κατά Gram αρνητικών μικροοργανισμών όπως επίσης μερικούς κατά Gram θετικούς.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο δραστικών ουσιών, χαρακτηρίζεται από έντονη συνεργική δράση κατά πολλών παθογόνων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων Μυκοπλασμάτων.

Διαθέτης:

FATRO HELLAS ΜΕΠΕ

20ΧΛΜ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΣΠΑΤΩΝ

ΠΑΙΑΝΙΑ 190 02