

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ALAMYCIN LA Ενέσιμο διάλυμα Oxytetracycline Dihydrate 216mg/ml για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)

Σύνθεση ανά 1 ml:

Oxytetracycline Dihydrate	: 216 mg
Ισοδυναμεί με Base	: 200 mg
<u>Εκδόχα:</u>	
Magnesium oxide	: 21,6 mg
Dimethylacetamide	: 0,5 mg
Disodium edetate	: 1 ml
Monoethanolamin Q.S. pH	: 8,3-8,8
Sodium Formaldehyde Sulphoxylate	: 4 mg
(ως αντιοξειδωτικό)	
Water for injection Q.S.	: 1 ml

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο υδατικό διάλυμα για παρεντερική χορήγηση

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

NORBROOK LABORATORIES LIMITED

Station Works, Newry, BT35 6JP

NORTHERN IRELAND

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμινγκ 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.21068.00.900

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ: Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Η οξυτετρακυκλίνη ενεργεί εναντίον ενός μεγάλου αριθμού Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων, πολλών ρικετσιών και μεγάλων ιών. Η Alamyacin LA injectable solution ενδείκνυται για την θεραπεία πολλών κοινών συστηματικών, αναπνευστικών και τοπικών λοιμώξεων που προκαλούνται ή που συνδέονται με μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην οξυτετρακυκλίνη, σε βοοειδή, πρόβατα και χοίρους.

Συμπεριλαμβάνονται ειδικές ενδείξεις όπως:

α) Βοοειδή: Ακτινοβακίλλωση, Διφθερίτιδα μόσχων, Ποδοδερματίτιδα, Μαστίτιδα, Μητρίτιδα, Παστεριδίωση, Πνευμονία, Αναπλάσματος.

β) Πρόβατα: Ποδοδερματίτιδα, Μαστίτιδα, Μητρίτιδα, Ομφαλίτιδα-Αρθρίτιδα και Χλαμύδιαση.

γ) Χοίροι: Ερυσίπελας, Σύνδρομο Μ.Μ.Α., Ομφαλίτιδα Αρθρίτιδα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Η δόση που συνιστάται είναι: 20mg/kg Σ.Β. (1ml / 10kg Σ.Β.)

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση ανεξάρτητα του μεγέθους του ζώου είναι:

Βοοειδή: 20 ml , Πρόβατα: 5 ml, Χοίροι: 10 ml, Χοιρίδια 1^{ης} ημέρας: 0,2 ml, Χοιρίδια 7^{ης} ημέρας: 0,3 ml Χοιρίδια 14^{ης} ημέρας: 0,4 ml, Χοιρίδια 21^{ης} ημέρας: 0,5 ml. Ανω των 21 ημερών: 1 ml / 10 kg Σ.Β.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Με βαθιά ενδομυϊκή ένεση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Καμία

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Να μην χορηγείται σε Αλογα, Σκύλους και Γάτες.

Να μην χορηγείται σε ζώα με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Παρότι το Alamyacin LA εμφανίζει ικανοποιητική ανεπιθύμητα, περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθεί μία ελαφρά τοπική αντίδραση παροδικού χαρακτήρα.

(Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Κρέας βοοειδή: 28 ημέρες, Χοίροι: 14 ημέρες, Πρόβατα: 7 ημέρες. Γάλα αγελάδες: 6 ημέρες

Το προϊόν να μην χορηγείται σε πρόβατα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Να διατηρείται σε δροσερό μέρος (θερμοκρασία όχι άνω των 25°C). Να προστατεύεται από το φως. Εάν ανοιχθεί η φιάλη, το περιεχόμενο της θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 4 εβδομάδες. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Διάρκεια ζωής 2 χρόνια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Να μην αραιώνεται η Alamyacin LA. Όταν συντρέχει και άλλη θεραπεία να χρησιμοποιείται διαφορετικό σημείο ένεσης.

Η χρήση της τετρακυκλίνης κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των δοντιών, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου σταδίου της εκγυμνωσης, μπορεί να προκαλέσει Δυσχρωμία των δοντιών. Η Alamyacin LA μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια στα γαλουχούντα ζώα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Να καταστρέφονται σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες Εθνικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: 25-5-2004

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φιαλίδια 100ml και 50ml σε κυτία των 12
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: 29142/25-5-2004

Το προϊόν θα διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77 93 777

001186106

